

Synthetic Chemistry of Fine Particles, 2019

微粒子合成化学・講義

<http://kogi.mura.site/>
E-mail: mura@tohoku.ac.jp

多元物質科学研究所 村松淳司

この講義目的

- ▶ 微粒子の合成に関する物理化学的知識を身につけること。
- ▶ 身の回りの表面科学・界面化学に関する現象を物理化学で考えること。
- ▶ コロイドの分散凝集等の界面化学や、吸着・表面反応等触媒反応の知識を取得することを目的とする。

講義概要

- ▶ 微粒子合成研究にとって基盤知識となる、表面や界面における物理化学を講義する。
- ▶ また、コロイド粒子の分散・凝集について、DLVO理論を元に考察する。
- ▶ 一方、固体表面の物理現象、吸着、表面反応についても理解を深める。

目標

- ▶ (1) 主に水溶液からの微粒子生成機構に関する物理化学的知識を得ること
- ▶ (2) 身の回りの表面科学・界面化学に関する現象が物理化学で説明できることを理解すること
- ▶ (3) ナノ粒子触媒の作用機構を理解すること
- ▶ (4) それらの現象を物理化学で説明できることを理解すること

講義の進め方

- ▶ 物理化学とはなんぞや
- ▶ 身の回りのコロイド現象から入ろう
- ▶ 微粒子とコロイドについて、物理化学をベースに考えよう

講義での約束！

- ▶ 出席重視です. というか, 出席のみとも, 言われる.
- ▶ そのため, 早退, 途中抜けは, 欠席扱いになります
- ▶ 遅刻は10分まで.
- ▶ それ以降の遅刻は減点します.
- ▶ 毎回の小テストは, 各項目3行以上書いて下さい.
- ▶ 分からない場合は, 何が分からないか, 書いて下さい.
- ▶ 各項目3行以上書いてあれば, 正解かどうか, など, 関係なく, 満点です. 全項目3行以上あれば, 100点です.
- ▶ 15回の講義のうち, 遅刻なく, 3行以上全部書いていけば, 概ね8回程度で, 単位を取れます.
- ▶ 居眠りさせないような講義にしますが, 万一寝た場合は, 起こすかもしれませんが, 暴れないでください.

講義での約束！

- ▶ 内職は止めてください。一発レッドカードの場合があります。
- ▶ 飲み物は自由です。
- ▶ アルコール類は、ご遠慮ください。
- ▶ 講義でビールを使う可能性があります。私は飲みません、というか、飲めません。
- ▶ 夏場は水分補給が必要です。眠気防止にも飲んで下さい。
- ▶ 食べ物は、ご遠慮下さい。
- ▶ ガムはシンガポールルールを適用します。
- ▶ おしゃべりは、ご遠慮下さい。というか、禁止！
- ▶ トイレは自由に行ってください。ただし、必ず戻ってきてください。
- ▶ 質問はメールでお願いします。電話はダメです。

物理化学 physical chemistry

▶ Physical (形容詞)

- 【1】物質の、物質的な、物質界の、自然の、自然界の、有形の、実際のな、実際の、天然の
- 【2】身体の、肉体の、身体的な、人的な
- 【3】相手の体を求めたがる、好色な
- 【4】物理学の、物理学上の、物理的な
- 【5】自然の法則による、自然科学の

物理化学とは

- ▶ 物質の動きをとらえる化学
- ▶ 平衡論と速度論の世界へ

物理化学 Physical Chemistry

▶ 平衡論

- Thermodynamics
- 粒子の分散・凝集 ⇒ DLVO理論

▶ 速度論

- 触媒反応
- 固体触媒
- 物理吸着 ⇒ 化学吸着 ⇒ 表面反応 ⇒ 脱離


物理化学 — 平衡論

コロイドとDLVO理論

コロイドとは何か

- ▶ 理化学辞典にみるコロイド
 - 物質がふつうの光学顕微鏡では認められないが、原子あるいは低分子よりは大きい粒子として分散しているとき、コロイド状態にある、という。
- ▶ コロイド粒子自体は定義が難しく、分散状態にあるときのみを、コロイド状態、と定義できる
- ▶ では、巨大分子が溶けているのと、何が違うのだろうか？

粒子径による粒子の分類



生活の中のコロイド

2019/4/16

身の回りのコロイドを見てみよう

身の回りのコロイド 温泉

別府・地獄めぐり 【血の池地獄】



この赤い温泉の原因は何か？


別府・地獄めぐり 【血の池地獄】

- ▶ 湧出量： 約1,800kl/日
- ▶ 泉質： 酸性緑礬泉
= 酸性-Fe(Ⅱ)-硫酸塩泉
- ▶ 泉温： 約78度



赤い色の原因は、第一鉄イオン(Fe(II))が酸化され、加水分解を起こして、固相析出した、水酸化鉄 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ あるいは、含水酸化鉄 FeOOH である。一部は、ヘマタイト Fe_2O_3 になっている。数ミクロン～数ミリの粒子であり、分散している。

別府・海地獄



この青い温泉の原因は何か？

別府・海地獄

- ▶ 従来は、硫酸第一鉄の青色とされてきた（公式には今も）
- ▶ ところが、成分分析すると、鉄イオンはほとんどない。
- ▶ なぜ、青色なのか。
- ▶ 海地獄のそばにある「神和苑」のお湯は、もっと青白い。

神和苑 温泉水 分析結果

京都大学地球熱学研究施設

	露天風呂流入口 (1997年11月4日)	露天風呂 #1 (1997年11月6日)	露天風呂 #2 (1997年11月9日)
水温 (°C)	75.6	42.1	43.5
pH	7.7	7.8	7.7
Na (mg/l)	1120	1140	1170
K (mg/l)	151	153	158
Ca (mg/l)	34.2	47.3	47.9
Mg (mg/l)	14.2	7.3	7.2
Cl (mg/l)	1680	1700	1700
SO ₄ (mg/l)	401	400	421
SiO ₂ #3 (mg/l)	466	444	406

#1 3日目：透明感のある青色

#2 6日目：白っぽい青色

#3 全シリカ


分析者：大沢信二・川村隆夫



青色の正体＝シリカコロイド

- ▶ このシリカコロイドは小さいためにまるで溶液のように見えたわけ。
- ▶ 光の波長よりも小さい。
- ▶ では、光の散乱現象はどうか

そのシリカコロイドの 電子顕微鏡写真



SiO₂(シリカ)微粒子

- ▶ 形は球形で、アモルファス(非晶質)であることがX線などの解析によってわかった。
- ▶ なお、FT-IRで分析したところ、SiO₂(シリカ)組成であることがわかった。
- ▶ 球形シリカ粒子は、高いアルカリ領域で加水分解により合成されるので、地下深部で高アルカリ、高温で生成したものと推測される。

なぜ、青いのか？

- ▶ Rayleigh散乱の概念で説明可能
- ▶ 粒径が小さくなると短い波長、つまり青色は散乱しやすい。
- ▶ 数十nm程度以下のシリカによって青色を散乱→懸濁液は青くなる

サイズパラメータ α は

$$\alpha = \frac{\pi d}{\lambda}$$

$\alpha \ll 1$ レイリー散乱

$\alpha \approx 1$ ミー散乱


$\alpha \gg 1$ 幾何光学近似

レイリー散乱の散乱係数 k_s は

$$k_s = \frac{2\pi^5}{3} n \left(\frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right)^2 \frac{d^6}{\lambda^4}$$

n :粒子数, d :粒子径, m :反射係数, λ :波長


ステンドグラスの色は金ナノ粒子の表面プラズモン共鳴によるもの……



呈色する金ナノ粒子

表面プラズモン共鳴： (p. 434)

金属中の電子が光と相互作用を起こす現象。金属が、nm サイズの粒子状や針状の突起物の先端部が周期的に並ぶような特殊な構造となる場合、その微細な領域中で伝導電子と光が共鳴して、これまでの常識を覆すような非常に高い光出力をもたらすなどの効果を発現する




教会のステンドグラス



Late Roman
Lycurgus Cup







Baroque Ruby Glass



金ナノ粒子のコロイド分散液

金ナノ粒子の形態の変化による色の変化



アスペクト比の上昇に伴い長波長側に吸収波長がシフト

身の回りのコロイド 牛乳

牛乳



栄養素名	人乳	牛乳
エネルギー	65kcal	67kcal
たんぱく質	1.1g	3.3g
脂質	3.5g	3.8g
炭水化物(糖質)	7.2g	4.8g
灰分(ミネラル等)	0.2g	0.7g
カリウム	48mg	150mg
カルシウム	27mg	110mg
リン	14mg	93mg
マグネシウム	3mg	10mg
ビタミンA(レチノール当量)	47 μ g	39 μ g
ビタミンK	1 μ g	2 μ g
ビタミンB ₁	0.01mg	0.04mg
ビタミンB ₂	0.03mg	0.15mg
ビタミンB ₁₂	Tr	0.3 μ g
パントテン酸	0.50mg	0.55mg




五訂日本食品標準成分表より：100g 当たり

水

乳脂肪


タンパク質



牛乳はO/Wエマルション



O/Wエマルション




W/Oエマルション


●食品エマルジョンの粒径分布測定

～異なるメーカーの珈琲用ミルクの粒径比較～


メーカーの異なる食品エマルジョンの粒径分布の比較例として、市販の珈琲用フレッシュミルクの粒径分布を比較した。




a) A社製 フレッシュミルク(粒径分布が広い)



b) B社製 フレッシュミルク(粒径が小さい)



b) C社製 フレッシュミルク(粒径が大きい)





水




サラダ油

Three glass vials with white caps are shown side-by-side. The left vial contains clear water. The middle vial contains a blue liquid with some white foam on top. The right vial contains a clear, yellowish liquid.

水

洗剤

サラダ油



サラダ油

水






洗剤なし



洗剤あり


墨汁もO/Wエマルション ～膠(にかわ)が吸着し分散している～



身の回りのコロイド ビール

ビールの泡

永山プロジェクト のビール




移流集積によって下から上に運ばれ、二次元の結晶構造を形成するコロイド。下の方のコロイドは動いているためブレている。 永山国昭(東京大学教養学部)




ビールの泡

- なぜ合一しにくいのか？
 - 分散安定化への指針
 - 泡の表面にホップと麦芽由来のフムロンや塩基性アミノ酸が吸着し、分散剂的な働きをしている



ビール酵母



ビールの上手な注ぎ方

あとはゆっくりと泡を立てずに
静かに注ぎます

ビールは純粹系



缶ビールを開けます



1/3まで一気に!





均一核生成：溶液中から泡が出てくる




不均一核生成：割り箸を入れると、割り箸から泡が出てくる

日本酒の発酵

酵母のゼータ電位はプラスチャージ。

発酵で生成したCO₂とともにマイナスチャージの泡とともに上方に登る
ビールの上面発酵酵母と同じ



上槽により、
清酒が得られる

